

תקופת המנתנה: יש להפסיק השימוש בסיגרו קדם-תערובת 7 ימים לפני השחיטה.
ازהרות:

- ערubb אך ורַק יחד עם מזון המיועד לפטמים או להודים.
- השתמש במינון המומלץ בלבד
- אין להשתמש בעת ובוונה אחת יחד עם תרופות אנטי-קוקסידאליות אחרות.

ازהרות למשתמש:

בשעת ערבול התערובת יש להשתמש בלבד בלבוש מגן, כפפות ובמיסיכת אבק. התרחץ היטב בסבון ובמים לאחר הטיפול בתערובת.

במקרה של מגע עם העיניים יש לשוטפן היטב במים. יש להרחיק את התכשיר מסוסים ודומיהם כי הוא עלול להיות רעיל לבני חיות אלו.

אחסנה: במקום קריר ויבש.

אריזה: כל שקית מכילה 20 ק"ג.

היצן: Punyang Hongtianwei Pharmaceuticals Ltd China.
עברית: אלפרמה אינק., ארה"ב.

בעל הרישום: א.ב-ץ' ייעוץ ושיווק בע"מ, גאליה 76885

מספר רישום התרופה: 082-99-91512

"פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידי"



**Cygro® 1% Premix Veterinary
סיגרו % 1% קדם-תערובת וטרינרי**

מאדראמיצין אמוניום %

Maduramicin ammonium 1%

לשימוש וטרינרי בלבד

קבוצה רפואי: אנטי-קוקסידיאלי

פעילות רפואי: תכשיר אנטיקוקסידיאלי לשימוש במזון פטמים והודים.

רכב: כל 1000 גרם סיגרו % 1% קדם-תערובת מכילים 10 גרם של מאדראמיצין אמוניום.

תאור: סיגרו % 1% קדם-תערובת משמש כמנע מחלת הקוקסידיוסיס, הנגרמת ע"י האימרה לסוגיה.

הוראות שימוש: יש להתmid בהזנה עם סיגרו % 1% קדם-תערובת מהיום הראשון לח'י הפטם עד ל-7 ימים לפני השחיטה.

יש להשתמש בתערובת עם התכשיר כמקור המזון היחיד במשר הטיפול.

להכנת תערובת המזון, יש לערubb בסיסודות 500 גרם סיגרו % 1% קדם-תערובת בתוך כל טונה אחת (1) של מזון. סיגרו % 1% קדם-תערובת הינו יציב גם בתערובת

וגם במזון בכופתיות.

לערובות המרבי של התכשיר מומלץ לדלן את התכשיר במזון ביחס 1 ב-10 לפני הערובות הסופי בתערובת.