

זמני המתנה: יש להפסיק הטיפול בתערובת הרפואית 5 ימים לפני שחיטה.

אזהרות:

- לא לשימוש במטילות.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- לשימוש וטרינרי בלבד.

אזהרות למפעיל:

אין לבלוע או לנשום אבק של תכשיר זה. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. כל כלי הכנה ישטף היטב מיד בסיום ההכנה (לפני ערבוב נוסף של תערובת מזון). המפעיל ישטוף ידיו בסבון ומים לאחר השימוש. באחריות המפעיל להכיר את כל הוראות הבטיחות כפי שרשומים ב-MSDS (material safety data sheet) של המוצר.

חומרי גלם בלתי פעילים:

Calcium lignosulphonate, Calcium sulphate dihydrate

אחסנה: לפני הפתיחה יש לאחסן במקום קריר ויבש, בטמפרטורה שאינה עולה על 25°C. ניתן להשתמש בתכשיר 12 שבועות לאחר שחזור.

מספר רישום: 143-37-33185-00

היצרן: Zoetis Medolla Manufacturing S.r.l, Via Rubadello 6, 41036, Medolla, Italy

בעל הרישום: א. בי-זי ייעוץ ושיווק בע"מ, מושב גאליה 76885



zoetis

AHZ 1040 1603



פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

רובנז 66 ג'י וטרינרי **ROBENZ 66 G VETERINARY**

קדם תערובת בצורת גרנולות אבקה

20 ק"ג

עפ"י מרשם רופא וטרינר בלבד

תכולה: כל 1 ק"ג מוצר מוגמר מכילים 66 גרם רובנידין הידרוכלוריד
Robenidine Hydrochloride.

קבוצה תרפויטית: קוקסידיוסטטים.

התוויות: לתרגולי פטם ותרגולי הודו למניעת קוקסידיוזיס.

מינון:

יש להוסיף 450-540 גרם של רובנז 66G לכל טונה מזון, בהתאם להוראות רופא וטרינר.

אופן השימוש:

תחילה יש להוסיף ולערבב באופן הומוגני כל כמות מינון הרובנז 66G יחד עם מזון בכמות של 10 פעמים ממשקלו. לאחר ערבוב הומוגני, יש להוסיף ליתרת כמות המזון ולערבב שוב עד לקבלת תערובת הומוגנית. לאחר הכנת התערובת הרפואית היא יציבה במשך 12 שבועות, כאשר התערובת מאוחסנת במקום קריר ויבש.

התוויות נגד: אין להשתמש בתכשיר במידה וידועה רגישות ל

Robenidine Hydrochloride.

אין לתת בו זמנית עם תכשיר אחר למניעת קוקסידיוזיס. יש להגיש רק תערובת רפואית זאת.