

The format of the leaflet/label is approved by MOH and its content was reviewed and approved
To be prescribed by a veterinarian only

Deccox 6% veterinary

Granular Premix for animals

Active ingredients:

Decoquinat in concentration of 60 g/kg product.

Therapeutic group: Quinoline coccidiostat.

Indications:

- For the treatment of coccidiosis in calves, lambs, goats, broilers.
- For prevention of coccidiosis in calves and for prevention of coccidiosis in lambs via administration to the mother ewe.
- As an aid in the prevention of abortions and perinatal losses due to toxoplasmosis by medication of ewe feed.

Methods of use and dosage:

- For the treatment of coccidiosis in calves, lambs, goats and prevention of coccidiosis in lambs: Match the concentration of decoquinat on the basis of daily consumption of 1 mg decoquinat per kg of body weight. Administration period: 28 days. If needed, can be used beyond this period.

- For the treatment of coccidiosis in broilers:

To each ton of feed add 0.50 kg of Deccox 6% veterinary (providing 30 ppm decoquinat). Administration period will be determined by a veterinarian.

- For prevention of coccidiosis in calves and for prevention of coccidiosis in lambs via administration to the mother ewe:

The concentration of decoquinat on a daily basis will provide consumption of 0.5 mg decoquinat per kg of body weight. Administration period: at least 28 days. If needed, can be used beyond this period. In acute cases, a double dose can be administered.

- As an aid in the prevention of abortions and perinatal losses due to toxoplasmosis by medication of ewe feed:

For use in a pregnant sheep.

The concentration of decoquinat on a daily basis will provide consumption of 2.0 mg decoquinat per kg of body weight.

Administration period: daily use for the last 14 weeks of the pregnancy.

Contraindications: Do not use simultaneously with another anti-coccidial product.

Withdrawal period:

- Withdrawal period for slaughtering of cattle, sheep - 1 day after the last treatment.
- Withdrawal period for slaughtering of broilers - 0 days after the last treatment.
- Milk: Do not use this product in dairy cows.

Warnings:

- Do not use in dairy cows.
- In treatment of lambs via administration to the mother ewe: in addition treat the lamb directly by oral treatment.
- Do not use simultaneously with another anti-coccidial product.
- Keep out of reach of children.
- For veterinary use only.

Any suspected adverse events can be reported to the Ministry of Health using an online form that can be found on the MoH website www.health.gov.il or by entering the following link:
<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

Storage conditions: Keep in a dry and cool place, below 25°C.

Shelf life after incorporation into final feed: 3 months.

Packaging quantity: 10 kg.

Registration number: 082 95 92333.

Manufacturer: Codbeck Blenders, England.

License holder: A.B.Z cons. and marketing Ltd., Galia 76885.

פרמט עלון/תווית זה נקבע על ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידי
על פי מרשם רופא וטרינר בלבד

דקוקס 6% וטרינרי

קדם תערוכות מגורענת לבעלי-חיים

חומרים פעילים: דקוקינאט בריכוז 60 גרם לכל ק"ג מוצר.

קבוצה תרפויטית: קוקסידיוסטאט מקבוצת קווינולינים.

התוויות:

- לטיפול בקוקסידיוזיס בעגלים, טלאים, עזים ופטמים.
- למניעת קוקסידיוזיס בעגלים ולמניעת קוקסידיוזיס בטלאים דרך מתן לכבשה האם.
- מתן לכבשה למניעת הפלות עוברים ומוות בלידה הנגרם מטוקסופלסמוזיס.

אופן השימוש ומינון:

- לטיפול בקוקסידיוזיס בעגלים, טלאים, עזים ומניעת קוקסידיוזיס בטלאים: יש להתאים ריכוז ה-decoquinat על בסיס יומי לצריכה של 1 מ"ג decoquinat לכל ק"ג משקל גוף. משך המתן – 28 יום. בעת הצורך ניתן להמשיך הטיפול מעבר לתקופה זו.

- לטיפול בקוקסידיוזיס בפטמים: לטיפול כל טונה מספוא, יש להוסיף 0.50 ק"ג דקוקס 6% וטרינרי (לקבלת 30ppm decoquinat). משך המתן יקבע ע"י רופא וטרינר.

- למניעת קוקסידיוזיס בעגלים ולמניעת קוקסידיוזיס בטלאים דרך מתן לכבשה האם: יש להתאים ריכוז ה-decoquinat על בסיס יומי לצריכה של 0.5 מ"ג decoquinat לכל ק"ג משקל גוף. משך המתן – לא פחות מ 28 יום. בעת הצורך ניתן להמשיך הטיפול מעבר לתקופה זו. במקרים חריפים, ניתן להכפיל את המינון.

- מתן לכבשה למניעת הפלות עוברים ומוות בלידה הנגרם מטוקסופלסמוזיס: לשימוש בכבשה בהריון. יש להתאים ריכוז ה-decoquinat על בסיס יומי לצריכה של 2.0 מ"ג decoquinat לכל ק"ג משקל גוף. משך המתן – טיפול יומי למשך 14 שבועות אחרונים של ההריון.

התווית נגד: אין להשתמש בו זמנית עם תכשיר אנטי-קוקסידיאלי נוסף.

תקופת ההמתנה:

- זמן המתנה לשחיטת בשר עבור בקר, צאן - יום אחד (1) לאחר הטיפול האחרון.
- זמן המתנה לשחיטת בשר פטמים – אפס ימים (0) לאחר הטיפול האחרון.
- חלב: התכשיר אינו מיועד לשימוש בחולבות.

אזהרות:

- לא לשימוש בפרות חולבות.
- בטיפול של טלאים דרך כבשת האם, יש בנוסף לתת טיפול אורלי ישירות לטלה.
- אין לערבב הטיפול בתכשיר זה יחד עם טיפולים אנטי-קוקסידיאליים נוספים.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- לשימוש וטרינרי בלבד.

"ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות www.health.gov.il או ע"י כניסה לקישור:
<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

חומרי גלם בלתי פעילים (Excipients):

Colloidal silica, Soya-bean oil, Wheat middlings

תנאי איחסון: יש לאחסן במקום קריר ויבש, מתחת ל- 25°C.

חיי מדף לאחר שחזור: 3 חודשים לאחר ערבוב עם מזון.

תכולה: 10 ק"ג

מספר רישום: 082 95 92333.

היצרן: Codbeck Blenders, England.

בעל הרישום: א.א. בי-זי יעוץ ושיווק בע"מ, גאליה 76885.

DECC 6 VET PL-LA 12-2015



7 290016 226072