

Volvac® ND+IB Var KV

FORMULA:

Biológico inactivado y formulado en un vehículo adyuvante oleoso conteniendo Virus de la Enfermedad de Newcastle, cepa LaSota, virus de Bronquitis serotipo Massachusetts y 2 cepas variantes de Bronquitis Infecciosa. Cada ml de vacuna contiene por lo menos $10^{8.5}$ DIEP50 del virus de Newcastle, $10^{7.0}$ DIEP50 del virus de Bronquitis serotipo Massachusetts y $10^{6.0}$ DIEP50 de cada una de las cepas variantes del virus de Bronquitis Infecciosa.

INDICACIONES:

Recomendada para la inmunización de pollas de reemplazo de ponedoras y reproductoras sanas entre las 4 y 18 semanas de edad contra la enfermedad de Newcastle y Bronquitis Infecciosa causada tanto por cepas variantes como estándar. El pollo de engorda también puede ser vacunado dependiendo de las indicaciones del Médico Veterinario encargado.

Únicamente vacune aves sanas

DOSIS:

Aplicar 0.5 ml por ave en cada etapa de inmunización, habitualmente sólo son necesarias 2 aplicaciones de la vacuna con un intervalo entre ellas de 8 a 10 semanas.

En algunas zonas con alta prevalencia de los agentes es necesario realizar 3 vacunaciones durante las etapas de crianza y desarrollo previo al ciclo productivo de las aves.

VIA DE ADMINISTRACION:

Subcutánea, en el tercio medio posterior del cuello.

ADVERTENCIAS:

Consérvese en refrigeración entre los 2° y 7° C, protegido de la luz solar directa. Evite la congelación.

No conserve restos para aplicaciones posteriores. Una vez utilizado el biológico, incinere el frasco vacío o aquellos remanentes de vacuna.

Lea con atención las instrucciones de la etiqueta antes de su aplicación.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consulte a su Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:

Frasco de 500 ml (1,000 dosis).